
Köver szöllö

Vass8R09s196-200



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp620

Che town soon soon of

Kover szöllő rese = 8 R9 s. 196-200









Kover szöllő DESIGNATION : CLOS & PLANCHE RANGS Vigueur: 2,5 PORT : éris - 2 éris - couché Hillerandage : 0 (un feu de coulme) Date de Véraison: 4.8.86 Date de Naturité: 8-9-86 Pourriture: O GRAPPE 19 G - FI - P: L - FI - C BAIL : TG - G - M - P19 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - (Rs) - Rg - H SAVLUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 \$25 avec pépins - apyrène 833 84 6 85 6 JUS X inc. - coloré

<u>Luminologia de la controlog</u>

dos 8 RANG 9 souche 196-200 Désignation : Kover szellő Année: 4.8 12-9.88 CHARGE : Véraison : Maturité : (confure) Pour.: 0 GRAPPE : 6 M P - Dim.: 15 a 18 Vigueur : POPT : érig - (1/2 érig - couché Année : BAIE : TG - G - M - P - Dim.: 19 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR: S-m-ar-fox-herb. Avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

duatudantudantudantud

ANNEE 1987 NOM Kover szöllő

United in the state of the stat

EMPLACEMENT 8 R9 1 196-200

dantadantadantadantad

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f			raisor mi/v		Maturité
1	4	3 14	7.4	10								
2	2	3,4	7,4	5								
3	4	31.3	3,4	6		10.6	14,6	17,6	6.8	10.8	13.8	28.9 PZ +6
4	4	3,4	7.4	9						+3		+6
5	5	3,4	7,4	7								
	19		1	37	19		11.			0 4		
	11.1		6.4	2+		7	Nr.6			Lot	enge" nem 3	
			+10							og.	new 3	

DESIGNATION: Rover Syllö EMPLACEMENT: 8 R9 S196, 200 Date de la vendange : 22.9.87 +5 Poids de la vendange: 5k 500 Nombre de souches: 3 1830 Date de Dégustation : 0 7 DEC. 1987 Nombre de grappes : 15 /367g

Pourriture : 0 OBSERVATIONS : Couleur: 18,2 (K.23) 40°2 note 2,19 . amer Acidité du moût : 4,59 Decembe Date : 20 4 Densité: 1018 Date : 5-10 Nise en bouteille
Densité: 994 Degré alcoolique: 10°3 \ 8 10 Acidité du vin : 5.0

NOM Köver szöllő n EMPLACEMENT 8 R.9 1 196. 200

-	+	0										
Souche	Nbre yeux	Débour début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	34334	84 54 1.4	114 84 54 81.4 54	28347							10.8	12.9
		Pourri	ture :	0	Port :/	m'arige	Vi	gueur	: 3,5 6	orme	Transport Control Control	1
			8,4	1			9.6			+3		+4

nlantanlantanlantanlantanl

ANNEE 1989 NOM Köver szöllő rose EMPLACEMENT 8 Rg s 196-200

1 1

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé: début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	6	243	3(3, 313, 313, 24.>.	12 8	23	30,5	56	12.6	31.7	7,8	14,8	
Po			.3,89		90%	Port	· Mu	enge	Vi.	 gueur	: 3/5	+

Köver szöllő cl 8 R 9 s - 196 - 200 (199)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Juntum lumtu

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 6 cotonneuses 6.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 0 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Köver ssjöllö clas 8 R9 a- 196-200 (199)

Désignation : Emplacement :

Juntandanda

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation :

Unntimbunti

Köver Szollo cla 8 R91-196-200,199)

Emplacement :

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 6 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré () - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé Albare subcontinues 5 - intermittentes 6.

: coloré (7) - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne (3)-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Kover szöllő dos 8 R 9 196-200 6 200)

doutodoutodoutodoutod

Désignation : Emplacement :

<u>luninalanda</u>n landari da

FEUILLE ADULTE

Colonne

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (lex duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9

limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Sley.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge (.)

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge (...)

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux () - duveteux () - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8.)

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Kover szöllő Désignation : Emplacement: Clot 8 Rg s 196. 200 (s.200) 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 47 x 24 - Lâche 7 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5. de taille régulière 7 - irrégulière (dimensions : 19 x 19). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière la irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 6. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long (- moyen & - court 3. or - dicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Juntanlanta

No d'ordre :

DENOMINATION: Kover Szöllő EMPLACEMENT: 8 R 9 S A 96.200 (A. 200)

Juntumbuntan

SARMENT DE VIGNE

sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (27).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

nlantanlantanlantanlantanl

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé(1).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre :
Désignation : Kover Spôllo
Emplacement : 8R9 s. 196-200

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : 7 - 8 - 9
L2/L
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Juntanianta

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271Dents : forme : 40 - 41Dents (angle) : 42 - 43 - 44Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües